



Informatie Ebglyss®

lebrikizumab

Je behandelend arts heeft EBGLYSS® voorgeschreven voor de behandeling van constitutioneel eczeem.

In het deel 'Over EBGLYSS®' vind je informatie over de werking van EBGLYSS®, hoe je het moet gebruiken en antwoorden op veelgestelde vragen.

Het 'EBGLYSS® Prikdagboek' biedt praktische informatie en bevat een dagboekgedeelte waarin je gemakkelijk kunt bijhouden waar en wanneer je hebt geprikt en bijhouden hoe het met je gaat.

Het deel 'Op reis met EBGLYSS®' beschrijft waar je op moet letten voor en tijdens je vakantie en bevat een medicatieverklaring dat door uw arts kan worden ingevuld, zodat u uw medicatie probleemloos over de grens kunt meenemen.

Lees voor gebruik van EBGLYSS® ook de bijsluiter in de verpakking en raadpleeg je arts of verpleegkundige bij vragen over EBGLYSS® of de behandeling.



Voorgevulde pen



Voorgevulde spuit



INHOUDSOPGAVE

Klik op het paginanummer om naar het onderwerp te gaan

Over EBGLYSS®

Constitutioneel eczeem en de oorzaak ervan	6 →
Behandeling van constitutioneel eczeem	8 →
Biologicals voor constitutioneel eczeem	10 →
Werkingsmechanisme van lebrikizumab	11 →
Dosering en toedieningsvorm	12 →
Starten met EBGLYSS®	14 →
Zo gebruik je de pen met EBGLYSS®	16 →
Zo gebruik je de spuit met EBGLYSS®	18 →
Hoe moet je EBGLYSS® bewaren?	21 →
Veiligheid	24 →
Het belang van therapietrouw	25 →
Praktische tips voor mensen met constitutioneel eczeem	27 →
Veelgestelde vragen	29 →

EBGLYSS® Prikdagboek

Het gebruik van het prikdagboek	31 →
---------------------------------	------

Op reis met EBGLYSS®

Praktische tips voor op reis	34 →
Checklist	38 →
EBGLYSS® medicatieverklaring	39 →



Over Ebglyss[®]

lebrikizumab

CONSTITUTIONEEL ECZEEM EN DE OORZAAK ERVAN

Wat is constitutioneel eczeem?

Constitutioneel eczeem, ook wel bekend als atopisch eczeem, is een veel voorkomende chronische ontstekingsziekte van de huid.

De ziekte kan jeuk, verkleuring, uitslag, blaasjes en een droge en schilferige huid veroorzaken. Die droge huid jeukt dus meestal erg. Eraan krabben kan uitslag geven die nog erger jeukt, wat weer tot meer krabben leidt.



Wereldwijd komt constitutioneel eczeem voor bij **2-7%** van alle volwassenen¹⁻⁴

1. Harrop J, et al. Clin Exp Allergy. 2007;37(4):526-535. **2.** Diepgen TL, et al. Br J Dermatol. 2016;174(2):319-329. **3.** Saeki H, et al. J Dermatol. 2006;33(11):817-819. **4.** Sacotte R, Silverberg JI. Clin Dermatol. 2018;36(5):595-605.



Wat is de oorzaak van constitutioneel eczeem?

Hoewel de exacte oorzaak van constitutioneel eczeem nog steeds niet bekend is, kunnen bepaalde sleutelfactoren eraan bijdragen.



Eén van die factoren is een **overactief afweersysteem**, dat bij mensen met constitutioneel eczeem mogelijk niet correct functioneert, waardoor de huid sterker reageert op verschillende prikkels. Dit kan komen doordat er te veel van een bepaald eiwit wordt geproduceerd, genaamd IL-13. Te veel van dit eiwit kan leiden tot ontstekingen.

Daarnaast kunnen **erfelijke factoren** een rol spelen. Als één van je ouders eczeem heeft, dan heb je zelf ook een grotere kans om het te krijgen.

Tot slot zijn er omgevingsfactoren die in verband worden gebracht met constitutioneel eczeem. Denk hierbij aan luchtvervuiling, allergenen en bepaalde chemische stoffen zoals wasmiddelen.

<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atopic-dermatitis-eczema/symptoms-causes/syc-20353273>, juli 2024 ; <https://www.niams.nih.gov/health-topics/atopic-dermatitis>, juli 2024

BEHANDELING VAN CONSTITUTIONEEL ECZEEM

Hoe wordt constitutioneel eczeem behandeld?

De behandeling van constitutioneel eczeem hangt af van de ernst van de ziekte. Verzachtende crèmes vormen de basisbehandeling van alle mensen met deze ziekte, naast het vermijden van prikkels en allergenen. Ook kan gebruik van een steroïden crème worden overwogen.



Je arts helpt je te beslissen wat de beste behandeling is voor jouw specifieke situatie

Wollenberg A et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32:657-82.



BIOLOGICALS VOOR CONSTITUTIONEEL ECZEEM

Wat zijn biologicals?

Biologicals zijn geneesmiddelen van natuurlijke eiwitten die de werking van ontstekingsstoffen of -cellen remmen. Het eiwit IL-13 speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van klachten bij constitutioneel eczeem.

Bij mensen met constitutioneel eczeem gedraagt het eiwit interleukine-13 (IL-13) zich afwijkend, wat kan leiden tot ontsteking, jeuk, uitslag en andere problemen van de huid.

Door IL-13 te blokkeren, kan een biological helpen de onderliggende ontsteking en klachten van constitutioneel eczeem, zoals jeuk, te verminderen.

Er zijn veel speciaal ontwikkelde biologicals voor de behandeling van allerlei ziekten, waaronder constitutioneel eczeem.




WERKINGSMECHANISME VAN LEBRIKIZUMAB

Lebrikizumab is een biological dat speciaal is ontwikkeld om zich te binden aan het eiwit IL-13.

Door het remmen van IL-13 helpt lebrikizumab de ontstekingen te verminderen die leiden tot een droge, jeukende en geïrriteerde huid.

Lebrikizumab is goedgekeurd voor de behandeling van matig tot ernstig constitutioneel eczeem bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kg die in aanmerking komen voor systemische therapie.



DOSERING EN TOEDIENINGSVORM

EBGLYSS® (lebrikizumab) is verkrijgbaar in twee toedieningsvormen: een voorgevulde pen en een voorgevulde spuit. Samen met je arts heb je gekozen voor een toedieningsvorm die het beste bij jou past.



Kenmerken van de voorgevulde pen met één dosis:

- Toedienen kan thuis
- Verborgen en automatische naald
- Injectietijd: 15 seconden
- Bevestiging dat de volledige dosis is toegediend

Je hoort 2 klikken: de eerste bij het starten van de injectie en de tweede als de injectie klaar is



Kenmerken van de voorgevulde spuit met één dosis:

- Toedienen kan thuis
- De snelheid van het injecteren bepaal je zelf




Je bewaart EBGLYSS®
in de koelkast



STARTEN MET EBGLYSS®

**EBGLYSS® is geschikt voor volwassenen en jongeren
(12-17 jaar; minimaal 40 kg).**



Na 16 weken gebruik van EBGLYSS® elke 2 weken, heb je samen met je arts de keuze om over te stappen naar de dosering van eenmaal per 4 weken.*

Als een goede klinische respons nog niet is bereikt kan je arts besluiten dat je tot week 24 om de week één injectie van 250 mg kunt krijgen.

* De aanbevolen dosering van EBGLYSS® (lebrikizumab) is: een startdosis van 500 mg (twee injecties van 250 mg) in week 0 en week 2, gevolgd door 250 mg elke 2 weken t/m week 16 of tot een goede klinische respons is bereikt; de onderhoudsdosis is 250 mg elke 4 weken.



ZO GEBRUIK JE DE PEN MET EBGLYSS®




Haal de EBGLYSS® voorgevulde pen met de grijze dop erop uit de doos en laat de voorgevulde pen 45 minuten op kamertemperatuur komen voordat je gaat injecteren.

1 Controleer de voorgevulde pen en het geneesmiddel

Zorg ervoor dat je het juiste geneesmiddel hebt. Het geneesmiddel erin moet helder zijn. Het kan kleurloos tot lichtgeel tot lichtbruin zijn.



2 Was uw handen met zeep en water



3 Kies de injectieplaats

Reinig de injectieplaats met een alcoholdoekje en laat het drogen. Jij of een ander persoon kan in deze gebieden injecteren:

- **Buikstreek** – ten minste 5 cm verwijderd van de navel.
- **Voorkant van het bovenbeen** – ten minste 5 cm boven de knie en 5 cm onder de lies.
- **Achterkant van de bovenarm** – een ander persoon moet in de achterkant van je bovenarm injecteren. Injecteer niet telkens op precies dezelfde plek.




4 Verwijder de dop van de pen

Zorg ervoor dat de pen vergrendeld is.

- Wanneer je klaar bent om te injecteren, draai je de grijze dop eraf en gooi je deze weg bij het huishoudelijk afval.
- Doe de dop niet terug op de naald. Dit kan de naald beschadigen. Raak de naald in de doorzichtige basis niet aan.

5 Plaatsen en ontgrendelen

- Zet de doorzichtige basis plat en stevig tegen de huid.
- Houd de doorzichtige basis op de huid en draai vervolgens de vergrendelingsring naar de ontgrendelde stand.



6 Houd 15 seconden ingedrukt


• Houd de paarse injectieknop ingedrukt en luister tot je 2 harde klikken hoort:

Eerste klik = injectie gestart

Tweede klik = injectie voltooid.


• De injectie kan tot 15 seconden duren.

Je weet dat de injectie voltooid is wanneer de grijze zuiger zichtbaar is.



7 De pen veilig weggooien

Doe de lege pen direct na gebruik in een stevige, goed sluitende, lekvrije en prikbestendige container.



Duidelijke stap-voor-stap-instructies voor de voorgevulde pen. Klik op de button voor de gebruiksaanwijzing.

ZO GEBRUIK JE DE SPUIT MET EBGLYSS®




Haal de EBGLYSS® voorgevulde spuit uit de doos en laat het 45 minuten op kamertemperatuur komen voordat je gaat injecteren.

1 Controleer de voorgevulde spuit en het geneesmiddel

Zorg ervoor dat je het juiste geneesmiddel hebt.

Het geneesmiddel erin moet helder zijn. Het kan kleurloos tot lichtgeel tot lichtbruin zijn.

2 Was uw handen met zeep en water




3 Kies de injectieplaats

Reinig de injectieplaats met een alcoholdoekje. Laat de injectieplaats drogen voordat je injecteert.


Jij of een ander persoon kan in deze gebieden injecteren:

- **Buikstreek** – ten minste 5 cm verwijderd van de navel.
 - **Voorkant van het bovenbeen** – ten minste 5 cm boven de knie en 5 cm onder de lies.
 - **Achterkant van de bovenarm** – een ander persoon moet in de achterkant van je bovenarm injecteren.
- Injecteer niet telkens op precies dezelfde plek.




4 Verwijder de dop van de spuit

Houd de voorgevulde spuit met EBGLYSS® in het midden van de spuit vast, met de naald van je af gericht. Trek de dop van de naald.




5 Knijp op de injectieplaats

Knijp voorzichtig een plooi in de huid van de injectieplaats (bovenbeen of buik, behalve 5 cm rond de navel, of de achterkant van de bovenarm als iemand anders gaat injecteren).




6 Plaats de naald

Steek de **naald helemaal in de huidplooi**, onder een hoek van ongeveer 45°.




7 Druk op de zuiger

Laat de plooi voorzichtig los, terwijl de naald op zijn plaats blijft. **Duw de zuiger langzaam en gelijkmatig helemaal naar beneden** tot hij niet verder kan en de spuit leeg is. Let op: het is normaal dat je een beetje weerstand voelt.



8 De spuit veilig weggoien

Til je duim op om **de zuiger los te laten**, zodat de naald wordt bedekt door de naaldbeschermer. Haal dan de spuit van de injectieplaats. Druk zachtjes met een wattenbolletje of gaasje op de injectieplaats als er bloed te zien is. Doe de dop niet terug op de naald. Wrijf na de injectie niet over de huid.



9 De spuit veilig weggoien

Doe de lege spuit en de naalddop direct na gebruik in een stevige, goed sluitende, lekvrije en prikbestendige container.



Duidelijke stap-voor-stap-instructies voor de voorgevulde spuit. Klik op de button voor de gebruiksaanwijzing.



HOE MOET JE EBGLYSS® BEWAREN?

- Gebruik het geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op de buitenverpakking of op het etiket van de pen of spuit na 'EXP'.
- Bewaar het geneesmiddel in de koelkast (2-8 °C), niet in de vriezer.
- EBGLYSS® kan tot 7 dagen buiten de koelkast worden bewaard bij een temperatuur beneden 30 °C. Daarna dient het te worden weggegooid. Eenmaal buiten de koelkast bewaard, niet terugplaatsen in de koelkast.


Noteer de tijd en datum waarop de pen of spuit voor de eerste keer uit de koelkast is gehaald in het daarvoor bedoelde vakje op de verpakking en ook de tijd en datum waarop deze niet meer dient te worden gebruikt.



gebruik
en.
de vriezer bewaren
innen 7 dagen gebruik
bescherming tegen l
koelkast:
151 - 08022

Voorbeeld: als je de pen of spuit op maandag (dag 1) om 12.00 uur 's ochtends uit de koelkast haalt, dan moet deze een week later op maandag (dag 7) voor 12.00 uur worden gebruikt. Noteer dit in je agenda of zet een herinnering in je telefoon.

- Bescherm het geneesmiddel tegen licht door het in de oorspronkelijke verpakking te bewaren.
- Gebruik het geneesmiddel niet als:
 - de pen of spuit is beschadigd;
 - het geneesmiddel troebel is;
 - het geneesmiddel duidelijk verkleurd is of als er zichtbare vlokjes in zitten.
- De pen of spuit mag niet worden geschud.
- De pen of spuit is bedoeld voor éénmalig gebruik.
- Vraag de apotheker wat je moet doen met geneesmiddelen die je niet meer gebruikt.
- Bewaar het geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.





VEILIGHEID

De veiligheid van EBGLYSS® is uitgebreid onderzocht. In klinische onderzoeken werden door sommige mensen bijwerkingen gemeld. De meeste bijwerkingen waren licht tot matig in ernst en leidden niet tot stopzetten van de behandeling.

De meest voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen) zijn:

- conjunctivitis (ontstoken slijmvlies van het oog)
- reacties op de injectieplaats
- allergische conjunctivitis
- droge ogen.



Breng je arts meteen op de hoogte als je een bijwerking krijgt of denkt te hebben



HET BELANG VAN THERAPIETROUW

Het is belangrijk om de behandeling trouw te volgen. Er zijn diverse methoden die je hierbij kunnen ondersteunen:

- Controlebezoeken en doelen stellen voor de korte termijn.
- Methoden ter verbetering van de therapietrouw zoals een alarm instellen op je telefoon of het invullen van het prikdagboek.
- Goede voorlichting over je therapie vergroot het begrip en vertrouwen in de behandeling, waardoor je gemotiveerder bent om de voorgeschreven behandeling te volgen.



Stel samen met je arts behandel-
doelen op en houd je aan een
controleschema. Neem bij vragen of
twijfels altijd contact op met de arts
of verpleegkundige





PRAKTISCHE TIPS VOOR MENSEN MET CONSTITUTIONEEL ECZEEM

Het veranderen van je leefstijl kan invloed hebben op de symptomen van constitutioneel eczeem.

Hieronder staan enkele gemakkelijk uit te voeren veranderingen, aangeraden door dermatologen.



Smeer na een bad of douche een vocht inbrengend product op de droge huid

Zo houd je de huid gehydrateerd en creëer je een barrière tussen jou en de omgeving. Gebruik een ongeparfumeerde crème of zalf en liever geen lotion.



Kies ongeparfumeerde huidverzorgingsproducten

Parfum kan een opvlamming van constitutioneel eczeem veroorzaken. Gebruik alleen producten met op het etiket de vermelding 'ongeparfumeerd' of 'parfumvrij'.



Neem een kort bad of korte douche om uitdroging van je huid te voorkomen

Ga hooguit 5-10 minuten onder de douche of in bad en gebruik lauwarm water. Breng het vochtinbrengende product aan terwijl je huid nog vochtig is van het douchen.



Draag ruimvallende kleding van 100% katoen

Met katoen kan je huid blijven ademen en het is minder irriterend. Vermijd strakke kleding en draag wol nooit rechtstreeks op je huid, om opvlammingen te voorkomen.



Was je kleding met een wasmiddel zonder geur- en kleurstoffen

Parfum en kleurstof in wasmiddelen kunnen een opvlamming uitlokken.




Was nieuwe kleding eerst voordat je die draagt



Bescherm je huid tegen extreme temperaturen

Door lage temperaturen kan je huid uitdrogen, wat een opvlamming kan veroorzaken. Als je oververhit raakt en veel zweet, kan het zweet ook een opvlamming uitlokken.





VEELGESTELDE VRAGEN

Wat als ik een injectie vergeet/oversla?

Een overgeslagen dosis moet zo snel mogelijk alsnog worden toegediend. Daarna moet de volgende dosis op het normaal geplande tijdstip worden geïnjecteerd.

Kan ik stoppen met dit medicijn of de dosering veranderen?

Bespreek alle veranderingen in de dosering eerst met je arts.

Hoe lang moet ik doorgaan met dit medicijn?

Je moet dit medicijn net zo lang blijven gebruiken als de arts tegen je zegt. Stop niet uit jezelf met de behandeling met EBGLYSS®.

Zijn er medicijnen die ik niet mag gebruiken tijdens mijn behandeling met EBGLYSS®?

Er zijn tot nu toe geen wisselwerkingen bekend met andere medicijnen. Praat met de arts als je je toch zorgen maakt.

Kan ik een vaccinatie krijgen zolang ik EBGLYSS® gebruik?

Je arts kan advies geven over het krijgen van vaccinaties vóór of tijdens je behandeling met EBGLYSS®. Maar waarschijnlijk wil je arts dat je voorafgaand aan de behandeling met EBGLYSS® alle leeftijdsggebonden vaccinaties al hebt gekregen, volgens de lokale richtlijnen. Vaccins met levend of levend verzwakt virus mogen namelijk niet tijdens de behandeling met EBGLYSS® worden gegeven.

Wat als ik zwanger word?

Er zijn weinig gegevens bekend over het gebruik van EBGLYSS® tijdens de zwangerschap. Vraag je arts om specifiek advies. Waarschijnlijk kun je het beste geen EBGLYSS® gebruiken tijdens een zwangerschap, vanwege het gebrek aan relevante klinische onderzoeken.

Kan EBGLYSS® invloed hebben op mijn rijvaardigheid?

EBGLYSS® heeft waarschijnlijk weinig invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.



Lees voor gebruik
goed de bijsluiter



Ebglyss[®] Prikdagboek

Eenvoudig bijhouden waar je hebt geprikt



Download hier het printbare prikdagboek



HET GEBRUIK VAN HET PRIKDAGBOEK

Met dit prikdagboek kun je gemakkelijk bijhouden waar en wanneer je hebt geprikt en bijhouden hoe het met je gaat.

Week 0 en 2

- Start bij week 0, vul daar de datum in van de dag dat je de twee injecties gaat plaatsen.
- Kies een injectieplaats voor de eerste injectie en geef dit aan in de betreffende cirkel. Voor de tweede injectie kies je een andere injectieplaats en geef dit op dezelfde manier aan. Op deze manier onthoud je waar je hebt geïnjecteerd en voorkom je dat je twee keer achter elkaar op dezelfde plaats injecteert.
- Geef met een smiley aan hoe je je voelt. Zo kan je de vooruitgang tijdens de behandeling goed volgen.
- Bij notities kan je extra informatie kwijt zoals een vraag die je aan je arts of verpleegkundige wilt stellen.
- Na exact twee weken doe je hetzelfde voor week 2.

Vanaf week 4 t/m week 16

- In deze periode ga je over op 1 injectie per twee weken, vul de datum in van de dag en kies iedere twee weken een andere injectieplaats.

Na week 16

- Na week 16 zijn er twee scenario's mogelijk:
 1. Samen met je arts wordt besloten dat je na week 16 naar 1 injectie per 4 weken gaat.
 2. Of, er wordt besloten dat het tot week 24 nodig is om door te gaan met 1 injectie per 2 weken.

Om deze reden zijn vanaf week 16 de weeknummers niet meer ingevuld en kan je deze zelf invullen.



Op reis met Ebglyss®

Tips, checklist en medicatieverklaring



PRAKTISCHE TIPS VOOR OP REIS

Reisvaccinaties

Niet alle vaccinaties kunnen worden gegeven als je EBGLYSS® gebruikt. Als je inenting(en) nodig hebt voor je reis, raadpleeg dan altijd je arts. Meer gedetailleerde informatie over EBGLYSS® kun je vinden in de bijsluiter.

Vorbereiding

- Maak vooraf een planning voor wanneer je de injectie(s) tijdens je vakantie gaat toedienen. Bespreek het schema indien nodig met je arts of verpleegkundige.
- Bij een reis naar het buitenland heb je een artsenverklaring nodig als bewijs dat je medicatie gebruikt. Deze verklaring vind je achterin dit boekje. Je arts of verpleegkundige kan deze invullen.
- Neem vóór vertrek contact op met de accommodatie waar je verblijft om te controleren of er een koelkast beschikbaar is om EBGLYSS® in te bewaren.
- EBGLYSS® kan ook buiten de koelkast worden bewaard voor maximaal 7 dagen bij een temperatuur die niet hoger is dan 30 °C. Eenmaal buiten de koelkast bewaard, mag het medicijn niet terug in de koelkast worden geplaatst. Zorg er dan voor dat je je volgende injectie plant binnen de 7 dagen na het verwijderen van het medicijn uit de koelkast.

Lange reizen

- Bespreek je reisplannen tijdig met je arts en zorg ervoor dat je voldoende EBGLYSS® bij je hebt voor de hele reis, zodat je geen injectie hoeft te missen.
- Raadpleeg je apotheker om te controleren of je alle benodigde materialen hebt voor het injecteren (zoals een koeltas, alcoholdoekjes, enzovoort).



Reizen met het vliegtuig

- Bewaar de EBGLYSS® in je handbagage, omdat de temperatuur en luchtdruk in het bagageruim kunnen variëren. Als EBGLYSS® in de ruimbagage wordt bewaard, kan het tijdens de vlucht bevriezen.
- Informeer de douane voordat jij en je tas door de scanner gaan dat je injecteerbare geneesmiddelen bij je hebt. Zorg dat je de begeleidende brief van je arts bij de hand hebt.
- Voor korte reizen (minder dan 12 uur) kan je een koeltas gebruiken om EBGLYSS® op de juiste temperatuur te houden.
- De koelelementen van de koeltas bevatten meer dan 100 ml vloeistof, maar zijn medisch noodzakelijk omdat de medicatie tussen 2 °C en 8 °C moet worden bewaard. Controleer of de douane van de landen waarin je reist dit accepteert.
- Bij lange reizen (zoals intercontinentale vluchten) kun je het cabinepersoneel vragen om EBGLYSS® in de koelkast van het vliegtuig te bewaren (niet in de vriezer). Vergeet niet de verpakking mee te nemen als je het vliegtuig verlaat!
- EBGLYSS® kan ook buiten de koelkast worden bewaard voor maximaal 7 dagen bij een temperatuur die niet hoger is dan 30 °C. Eenmaal buiten de koelkast bewaard, mag het medicijn niet terug in de koelkast worden geplaatst. Zorg er dan voor dat je je volgende injectie plant binnen de 7 dagen na het verwijderen van het medicijn uit de koelkast.

Tips voor het bewaren van EBGLYSS®

- Bewaar EBGLYSS® in de originele verpakking, bij voorkeur in een afgesloten plastic zak, om het tegen vocht te beschermen. Zorg ervoor dat het etiket van de apotheek op de verpakking zit.
- Stel EBGLYSS® niet bloot aan zonlicht.
- Bewaar het geneesmiddel in de koelkast (2–8 °C).
- De voorgevulde pen of spuit kan tot 7 dagen buiten de koelkast worden bewaard bij een temperatuur onder de 30 °C. Daarna moet het worden weggegooid.

Noteer de tijd en datum waarop de pen of spuit voor het eerst uit de koelkast is gehaald, evenals de tijd en datum waarop deze niet meer gebruikt mag worden.

Gebruik het geneesmiddel niet als:


- de pen of spuit beschadigd is;
- het geneesmiddel troebel is;
- het geneesmiddel duidelijk verkleurd is of zichtbare vlokjes bevat.

Let op

- Schud de pen of spuit niet.
- De pen of spuit is bedoeld voor eenmalig gebruik.



Voorbeeld: als je de pen of spuit op maandag (dag 1) om 12.00 uur 's ochtends uit de koelkast haalt, dan moet deze een week later op maandag (dag 7) voor 12.00 uur worden gebruikt. Noteer dit in je agenda of zet een herinnering in je telefoon.



CHECKLIST

Vorbereidingen tot een week voor vertrek:

- Vraag je arts of verpleegkundige om de begeleidende brief voor reizen met EBGLYSS® in te vullen en vraag een kopie van je medicatielijst.
- Controleer met de apotheker of je alle benodigdheden hebt voor injectie.
- Bij twijfel, overleg met de luchtvaartmaatschappij of zij EBGLYSS® in de koelkast van het vliegtuig kunnen bewaren.
- Neem contact op met de accommodatie op je bestemming om te vragen of er een koelkast beschikbaar is om EBGLYSS® op te slaan.
- EBGLYSS® kan maximaal 7 dagen buiten de koelkast bewaard worden bij een temperatuur van maximaal 30 °C. Zodra het medicijn buiten de koelkast bewaard is, mag het niet teruggeplaatst worden. Zorg er in dat geval voor dat je de volgende injectie binnen 7 dagen na het uit de koelkast halen plant.

Vorbereidingen enkele dagen voor vertrek:

- Zorg ervoor dat je wattenbolletjes of gaasjes en alcoholdoekjes in je bagage hebt.

Vlak voor vertrek:

- Plaats EBGLYSS® in de koeltas met de gekoelde elementen.
- Zorg dat je de begeleidende brief van je arts of verpleegkundige bij de hand hebt.





EBGLYSS® MEDICATIEVERKLARING

Voor wie het aangaat,
Ik heb EBGLYSS® (lebrikizumab) voorgeschreven aan mijn patiënt:

(volledige naam)

Dit geneesmiddel wordt toegediend door middel van zelfinjectie en bevat daarom een naald. Het wordt geleverd als een voorgevulde pen en spuit voor éénmalig gebruik: 250 mg = 2 ml.

EBGLYSS® moet koel worden bewaard tussen 2 °C en 8 °C en moet daarom in een koeltas in de vliegtuigcabine worden vervoerd.

Tijdens vluchten die langer duren dan 12 uur moet het in de koelkast van het vliegtuig worden bewaard.

Als deze informatie moet worden bevestigd, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

(handtekening)

Naam arts: _____

BIG-nummer: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres: _____

Adres: _____

EBGLYSS® MEDICATION STATEMENT

To whom this may concern,
I have prescribed EBGLYSS® (lebrikizumab) for my patient:

(complete name)

This medicine can be self-administered and so it contains a needle. It is supplied in the form of a single-use injection pen and prefilled syringe: 250 mg = 2 ml.

EBGLYSS® should be stored between 2 °C and 8 °C and so must be carried in the airplane cabin in its travel pack and placed in the refrigerator during long flights (more than 12 hours).

If you would like me to confirm this information, please contact my office directly.

Yours sincerely,

(signature)


Name Dr: _____

Licence number: _____

Phone number: _____

E-mail: _____

Address: _____



 **Ebglyss**[®] ▼
lebrikizumab



Almirall B.V.
Van Deventerlaan 31
3528 AG Utrecht | The Netherlands

Almirall NV
Lenneke Marelaan 4
1932 Zaventem | Belgium